


Fordeling af insulin i LÅR - fra pressefold til sidesøm.

Der kan injiceres fra lysken til en håndsbredde over knæet.
Der skal være MINIMUM 1 cm mellem hvert stik.

Dokumenter i Cura - ikke her



Stikkeskemaer

Vejledning til dig der giver injektion insulin




Arbejdsgang for dokumentation af insulingivning

- Ved injektion af insulin skal det aktuelle stikkeskema være tilgængeligt (det kan printes fra instrukser.aalborg.dk link)
- Åbn Kortet "Fast administration" og orienter dig i "Fast medicin ikke dispenseret"
- Tryk på dosis eller ? ud for det tidspunkt insulinen skal injiceres
- Vælg effektuering
- Se i "Administrationshistorik", hvor der sidst er injiceret insulin
- Hvis det fx er Lår 5, finder du nr. 6 på stikkeskemaet: "Fordeling af insulin i lår"
- Når insulinen er injiceret skrives der i "Bemærkning", hvor medicinen er injiceret jf. stikkeskema (her skrives nummeret fra stikkekemaet: fx Lår 6)
- Gem

Fordeling af insulin i MAVE

Der kan injiceres i hele maveregionen, dog 1,5 cm. fra navlen.
Der skal være MINIMUM 1 cm mellem hvert stik.

Dokumenter i Cura - ikke her



Fordeling af insulin på HOFTE

Der kan injiceres i øverste laterale kvadrat.
Der skal være MINIMUM 1 cm mellem hvert stik.

Dokumenter i Cura - ikke her

