

## Stikkeskema og arbejdsgang vedr. fordeling af blodfortyndende medicin(inj.) i MAVE



### Arbejdsgang: Fordeling af blodfortyndende medicin(inj.) i MAVE

Ved injektion af blodfortyndende medicin (fx Innohep), skal stikkeskemaet "Fordeling af blodfortyndende medicin (inj.)" være tilgængeligt.

- Åbn Kortet "Fast administration" og orienter dig i "Fast medicin ikke dispenseret"
- Tryk på dosis ud for det tidspunkt medicinen skal injiceres
- Vælg effektivering
- Se i "Administrationshistorik", hvor der sidst er injiceret blodfortyndende medicin
- Hvis det fx er Mave 5, finder du nr. 6 på stikkeskemaet: "Fordeling af blodfortyndende medicin (inj.)"
- Når den blodfortyndende medicin er injiceret skrives der i "Bemærkning", hvor medicinen er injiceret jf. stikkeskemaet (her skrives nummeret fra stikkeskema, fx Mave 6)
- Gem

### Fordeling af blodfortyndende medicin(inj.) i MAVE

Der må KUN injiceres i maveregionen under navlen (min. 1,5 cm. fra navlen). Der skal være MINIMUM 1 cm mellem hvert stik.

#### Dokumenter i Cura - ikke her

