







Valg af sårbehandlingsprodukter – Hjemmesygeplejen Centrum 2020

OPRENSNING – SÅRKONTAKTLAG – ABSORBERENDE LAG – YDERFORBINDING – VEJLEDENDE SKIFTEINTERVAL

Oprensningsfasen			Granulations fasen	Ophelings fasen	Diabetiske fodsår
					
Inficerede sår	Nekrotiske sår	Fibrinbelagte sår	Moderat væskende sår	Rene sår	
Microdacynvæske i 10 min. og debridering med skalpel eller curette	Tørre: På tæer og hæle behandles helt tørt. Fugtige: Microdacynvæske i 10 min. og debridering med skalpel eller curette	Microdacynvæske i 10 min. og debridering med skalpel eller curette	Microdacynvæske i 10 min. og debridering for avital væv	Soigneret med postevand, <u>ingen</u> debridering	Microdacynvæske i 10 min. og debridering med skalpel eller curette Fjern hyperkeratose
Sorbact plaster til overfladiske og tørre sår Lomatuell H til svagt væskende hvor forbindelse hænger i	Aquacel Ag + Ekstra Acticoat ved svær infektion Lomatuell H	Tørre: Lomatuell eller væd Aquacel AG + Ekstra med Microdazyn gel Comfeel Plus Transparent	<u>Skal have ro</u> Tørre sår Lomatuell H Våde sår Aquacel Ekstra	<u>Skal have ro</u> Tørre sår Lomatuell H Våde sår Aquacel Ekstra	Microdazyn Gel Aquacel Ag + Ekstra Biatain Ag
Aquacel Ag + Ekstra Acticoat ved svær infektion Biatain Ag	Superabsorbant Biatain Border Allevyn Gentle Border Biatain Ag Allevyn Lite	Levertransalve 25% ved synlig knogle eller sene Lomatuell H Allevyn Gentle Border	Kliniplast Allevyn Lite Allevyn Gentle Border Biatain Border	Allevyn Lite Allevyn Gentle Border Biatain Border Comfeel Plus Transparent	Mepilex Lite Allevyn Lite Allevyn Gentle Border KUN FIKSERING MED EVERCARE
Superabsorbant Biatain Border Allevyn Gentle Border Allevyn Lite	Aquacel Ag + Ekstra Biatain Allevyn Gentle Border Kliniderm Superabsorbant	Biatain Ag Aquacel Ag + Ekstra Mepilex border Kliniderm Superabsorbant	OBS kompression ved ødemer. Hvis det undlades opstår der recidiv	OBS kompression ved ødemer. Hvis det undlades opstår der recidiv	OBS compliance Tilse fodtøj OBS neuropati
Daglig tilsyn ved begyndende sekretion og infektion Altid kontakt til egen læge ang henv til kar kir	Daglig tilsyn ved begyndende sekretion og infektion Altid kontakt til egen læge ang henv til kar kir	Afhængig af sekretionsgraden	Sårbehandling x 1 ugentl hvis forbindelse tillader det	Sårbehandling x 1 ugentl hvis forbindelse tillader det	Daglig tilsyn ved inf pga obs ostit Elles 3 x uge Altid kontakt til egen læge ang henv endo eller Steno Amb

Tag foto af såret med pleje.net app ved behov for sparring med sårsygeplejerske og digital sårtriage